

ANDROCUR[®] 50 mg, tabletti

syproteroniasetaatti

Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

- Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle, eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.

Tässä selosteessa esitetään:

1. Mitä Androcur on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin käytät Androcur-valmistetta
3. Miten Androcur-valmistetta käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Androcur-valmisteen säilyttäminen
6. Muuta tietoa

1. MITÄ ANDROCUR ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Androcur on antiandrogeeninen hormonivalmiste. Se estää androgeenien eli miessukupuolihormonien vaikutuksen kohde-elimiin ehkäisten näin androgeeniperäisiä vahingollisia häiriöitä. Miessukupuolihormoneja syntyy vähäisessä määrin myös naisen elimistössä. Lisäksi Androcur vähentää testosteronin määrää verenkierrossa, millä on myös hoitava vaikutus. Suurten syproteroniasetaattiannosten käytön yhteydessä on havaittu, että prolaktiini-nimisen hormonin pitoisuudet voivat joskus hieman lisääntyä.

Androcur-valmisteen vaikutuksesta *miehen* seksuaalivietti sekä potenssi heikkenevät ja kivesten toiminta estyy. Nämä muutokset palautuvat hoidon jälkeen.

Androcur-valmiste estää sukurauhasten ja/tai lisämunuaisten tuottamien androgeenien vaikutuksen androgeeneistä riippuvissa kohde-elimissä kuten eturauhasessa .

Androcur-hoidolla on suotuista vaikutus *naisen* androgeeniperäisiin oireisiin, kuten vaikeaan hirsutismiin (liiallinen karvan kasvu) sekä kiihtyneeseen talirauhasten toimintaan aknessa ja seborreassa (ihon liiallinen rasvaisuus ja hilseily). Kun hoitoon yhdistetään yhdistelmäehkäisytabletit, myös munasarjojen toiminta estyy. Nämä muutokset palautuvat hoidon jälkeen.

Mihin Androcur-valmistetta käytetään?

Androcur-valmistetta käytetään

- miehille eturauhassyövän sekä vahingollisten seksuaalitoimintojen häiriöiden hoitoon

- naisille vaikean androgeeniperäisen aknen (finnitauti), seborrean (ihon liiallinen rasvaisuus ja hilseily) ja/tai hirsutismin (liiallinen karvan kasvu, erityisesti kasvoissa) hoitoon.

2. ENNEN KUIN KÄYTÄ ANDROCUR-VALMISTETTA

Älä käytä Androcur-valmistetta, jos jokin alla olevista kohdista koskee sinua, vaan ota yhteyttä lääkäriisi:

Miehet

Vahingollisten seksuaalitoimintojen häiriöiden hoidon yhteydessä, älä käytä Androcur-valmistetta.

- jos sinulla on maksasairaus
- jos sinulla on perinnöllisiä maksatoiminnan häiriöitä ja bilirubiinin (hemoglobiinin hajoamistuote) erittyminen elimistöstä on heikentynyt (Dubin-Johnsonin tai Rotorin oireyhtymä)
- jos sinulla on tai on ollut hyvän- tai pahanlaatuinen maksakasvain
- jos sinulla on joskus todettu meningeooma (yleensä hyvänlaatuinen kasvain aivojen ja kallon välisessä kudoskerroksessa)
- jos sinulla on toimintakykyä heikentävä sairaus
- jos sinulla on vaikea pitkäaikainen masennus
- jos sinulla on tai on ollut verenkierron häiriöitä, etenkin verisuonitukoksia (tromboembolinen tapahtuma)
- jos sinulla on vaikea diabetes, johon liittyy verisuonivaurioita
- jos sinulla on sirppisoluanemia
- jos olet yliherkkä syproteroniasetaatille tai jollekin muulle Androcur-valmisteen aineosalle.

Eturauhassyövän hoidon yhteydessä, älä käytä Androcur-valmistetta.

- jos sinulla on maksasairaus
- jos sinulla on perinnöllisiä maksatoiminnan häiriöitä ja bilirubiinin (hemoglobiinin hajoamistuote) erittyminen elimistöstä on heikentynyt (Dubin-Johnsonin tai Rotorin oireyhtymä)
- jos sinulla on tai on ollut hyvän- tai pahanlaatuinen maksakasvain (eturauhassyövän etäpesäkettä lukuun ottamatta)
- jos sinulla on joskus todettu meningeooma (yleensä hyvänlaatuinen kasvain aivojen ja kallon välisessä kudoskerroksessa)
- jos sinulla on toimintakykyä heikentävä sairaus (eturauhassyöpää lukuun ottamatta)
- jos sinulla on vaikea pitkäaikainen masennus
- jos sinulla on tai on ollut verenkierron häiriöitä, etenkin verisuonitukoksia (tromboembolinen tapahtuma)
- jos olet yliherkkä syproteroniasetaatille tai jollekin muulle Androcur-valmisteen aineosalle.

Naiset

Älä käytä Androcur-valmistetta.

- jos olet raskaana tai imetät
- jos sinulla on maksasairaus
- jos sinulla on esiintynyt keltaisuutta tai voimakasta kutinaa aiempien raskauksien yhteydessä
- jos sinulla on ollut raskaudenaikainen rakkulaihottuma (herpes gestationis)
- jos sinulla on perinnöllisiä maksatoiminnan häiriöitä ja bilirubiinin (hemoglobiinin hajoamistuote) erittyminen elimistöstä on heikentynyt (Dubin-Johnsonin tai Rotorin oireyhtymä)
- jos sinulla on joskus todettu meningeooma (yleensä hyvänlaatuinen kasvain aivojen ja kallon välisessä kudosterroksessa)
- jos sinulla on tai on ollut hyvän- tai pahanlaatuinen maksakasvain
- jos sinulla on toimintakykyä heikentävä sairaus
- jos sinulla on vaikea pitkäaikainen masennus
- jos sinulla on tai on ollut verenkierron häiriöitä, etenkin verisuonitukoksia (tromboembolinen tapahtuma)
- jos sinulla on vaikea diabetes, johon liittyy verisuonivaurioita
- jos sinulla on sirppisoluanemia
- jos olet yliherkkä syproteroniasetaatille tai jollekin muulle Androcur-valmisteen aineosalle.

Jos lääkäri on määrännyt sinulle Androcur-valmisteen lisäksi yhdistelmäehkäisytabletteja (Diane Nova), huomioon tulee ottaa myös ehkäisytablettien pakkausselosteessa mainitut ohjeet.

Hyvä tietää ennen Androcur-valmisteen käyttöä

- Androcur-hoitoa ei saa määrätä alle murrosikäisille nuorille ja lapsille, koska hoidon epäsuotuisaa vaikutusta pituuskasvuun ja kehittyvään hormonitoimintaan ei voida sulkea pois.
- Hoidon aikana tulee seurata säännöllisesti maksan toimintaa ja hormoneja tuottavan lisämunuaiskuoren toimintaa sekä punasolujen määrää.
- Suuriannoksisen Androcur-hoidon yhteydessä on yksittäistapauksissa ilmennyt maksan toimintahäiriöitä (hepatiitti ja maksan vajaatoiminta, joka on joissakin tapauksissa johtanut kuolemaan). Useimmat raportoidut tapaukset ovat koskeneet eturauhassyöpää sairastavia miehiä. Maksan toimintahäiriöt ovat annoksesta riippuvaisia, ja niitä kehittyvä tavallisesti usean kuukauden kuluttua hoidon aloittamisesta. Lääkärin tulee seurata maksan toimintaa ennen hoidon aloittamista ja hoidon aikana, etenkin jos ilmaantuu maksatoksisuuteen viittaavia oireita (esim. kutinaa koko vartalon alueella tai ihon keltaisuutta).
- Yksittäistapauksissa on todettu hyvän- tai pahanlaatuisia maksakasvaimia, kuten muidenkin sukupuolisteroidien käytön yhteydessä. Erittäin harvinaisissa tapauksissa maksakasvaimet saattavat johtaa hengenvaaralliseen sisäiseen verenvuotoon. Tämän

vuoksi sinun tulee kertoa lääkärillesi, jos sinulla ilmenee epätavallisia ylävatsaoireita, jotka eivät häviä nopeasti itsestään.

- Kerro lääkärillesi, jos sinulla on diabetes, sillä Androcur-hoidon aikana diabetesta täytyy seurata erityisen huolellisesti.
- Androcur-hoidon aikana saattaa joskus esiintyä hengenahdistusta.
- Androcur-valmisteen käyttöön liittyviä tromboembolisia tapahtumia on raportoitu, mutta näiden tapahtumien ja valmisteen käytön yhteydestä ei kuitenkaan ole yksimielisyyttä. Tromboembolisten tapahtumien riski on tavallista suurempi, jos potilaalla on ilmennyt jo aiemmin laskimon tai valtimon tromboottisia tai tromboembolisia tapahtumia (esim. syvä laskimotukos, keuhkoveritulppa, sydäninfarkti) tai aivoverisuonitapahtumia (aivoveritulppa) tai jos hänellä on pitkälle edennyt pahanlaatuinen sairaus.

Ohjeita miehille

Kun Androcur-valmistetta käytetään vahingollisten seksuaalitoimintojen häiriöiden hoitoon, alkoholin estoja vähentävä vaikutus voi vähentää Androcur-hoidon seksuaaliviettä estävää vaikutusta.

Jos sinulla on eturauhassyöpä, kerro lääkärillesi, jos sinulla on aiemmin ollut verenkiertohäiriöitä, etenkin jos häiriöt ovat liittyneet verisuonitukoksiin (tromboembolinen tapahtuma) tai jos sinulla on sirppisoluanemia tai vakava diabetes, johon liittyy verisuonimuutoksia. Näiden sairauksien yhteydessä täytyy riskit ja hyödyt arvioida huolellisesti kunkin potilaan kohdalla erikseen ennen Androcur-hoidon aloittamista.

Ohjeita naisille

Ennen Androcur-hoidon aloittamista naispotilaalle on tehtävä perusteellinen lääkärintarkastus ja gynekologinen tutkimus (myös rinnat ja kohdunkaulan irtosolututkimus) ja varmistettava, ettei nainen ole raskaana.

Jos yhdistelmähoiton aikana esiintyy vähäisiä epäsäännöllisiä vuotoja niiden kolmen viikon aikana, jolloin tabletteja otetaan, tablettien käyttöä ei tulisi lopettaa. Jos vuoto on kuitenkin runsasta, ota yhteyttä lääkäriin.

Yhdistelmähoiton aikana on otettava huomioon myös yhdistelmäehkäisyvalmisteen pakkausselosteessa annetut ohjeet.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Suun kautta otettavan diabeteslääkityksen ja insuliinin tarve saattaa muuttua Androcur-hoidon aikana.

Kerro lääkärillesi tai apteekkiin jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Tämä koskee erityisesti lääkkeitä, jotka sisältävät ketokonatsolia, itrakonatsolia, klotrimatsolia, ritonaviiria, rifampisiinia ja fenytoiinia, sekä mäkikuismaa sisältäviä valmisteita ja statiineihin kuuluvia lääkkeitä (veren rasvapitoisuutta, esimerkiksi kolesterolia tai triglyseridejä, vähentävät lääkkeitä).

Statiinien käyttöön liittyy lihaskudokseen liittyviä haittavaikutuksia (myopatia tai rbdomyolyysi), ja niiden riski voi olla tavallista suurempi, jos tiettyjä statiineja käytetään samaan aikaan suurten Androcur -annosten kanssa, sillä näillä lääkeaineilla on sama aineenvaihduntareitti.

Androcur-valmisteen käyttö ruuan ja juoman kanssa

Tabletit otetaan aterian jälkeen, ja ne tulee niellä nesteen kera.

Raskaus ja imetys

Androcur-valmistetta ei saa käyttää raskauden eikä imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Androcur-valmisteen käytön yhteydessä saattaa esiintyä väsymystä ja haluttomuutta, jotka voivat heikentää keskittymiskykyä. Tämä pitää ottaa huomioon, jos työsi vaatii erityistä valppautta (esim. ajoneuvon kuljettaminen liikenteessä, koneiden käyttäminen).

3. MITEN ANDROCUR-VALMISTETTA KÄYTETÄÄN

Androcur-tabletteja otetaan yksilöllisesti lääkärin ohjeen mukaan. Noudata aina lääkärin sinulle antamia annostusohjeita.

Tabletit otetaan aterian jälkeen ja ne tulee niellä nesteen kera.

Miehet

Eturauhassyöpä

Tavallinen annos on 2 tablettia 2–3 kertaa päivässä.

Hoitoa ei tule lopettaa eikä annosta pienentää oireiden lievenemisen tai remission jälkeen.

- Mieshormonien lisääntymisen vähentäminen GnRH-agonistihoidon alkuvaiheessa

Annos on 2 tablettia 2 kertaa päivässä. Androcur-hoito aloitetaan 5–7 päivää ennen GnRH-agonistihoidon aloittamista, ja sitä jatketaan 3–4 viikkoa rinnakkain GnRH-agonistin kanssa.

- Kuumien aaltojen hoito GnRH-analogihoidon aikana tai kivesten poistoleikkauksen jälkeen

Tavallinen annos on 1–3 tablettia päivässä. Annos voidaan tarvittaessa suurentaa 2 tablettiin 3 kertaa päivässä.

Miesten vahingolliset seksuaalitoimintojen häiriöt

Aloitusannos on tavallisesti 1 tabletti 2 kertaa päivässä. Annos voidaan tarvittaessa suurentaa 2 tablettiin 2 kertaa päivässä ja lyhyeksi ajaksi jopa 2 tablettiin 3 kertaa päivässä.

Kun tyydyttävä hoitotulos on saavutettu, vaikutus pyritään ylläpitämään mahdollisimman pienellä vuorokausiannoksella. Yleensä ylläpitoannokseksi riittää ½ tablettia 2 kertaa päivässä. Kun ylläpitoannosta määritetään tai kun valmisteen käyttö lopetetaan, annosta ei tule vähentää yhtäkkiä vaan vähitellen. Päiväannosta tulee vähentää yhdellä tai mieluummin ½ tabletilla muutaman viikon välein.

Hoitovaikutuksen tasaamiseksi Androcur-hoidon tulee olla pitkäaikaista ja mikäli mahdollista, siihen tulisi liittää psykoterapeuttinen hoito.

Jos Androcur-hoidon vaikutus tuntuu sinusta liian voimakkaalta tai liian heikolta, ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin.

Naiset

Naisten vaikeat androgeeniperäiset oireet, kuten voimakas hirsutismi, vaikea akne ja/tai seborrea

Hedelmällisessä iässä olevat naiset

Koska valmistetta ei saa käyttää raskauden aikana, on raskauden mahdollisuus suljettava pois ennen hoidon aloittamista.

Hedelmällisessä iässä olevien naisten hoito aloitetaan kuukautiskierron 1. päivänä (= 1. vuotopäivä). Vain naiset, joilta kuukautiset puuttuvat, voivat aloittaa hoidon heti. Tällöin 1. hoitopäivä katsotaan kierron 1. päiväksi ja hoito toteutetaan alla olevien annostusohjeiden mukaan.

Kuukautiskierron 1.–10. päivinä otetaan 2 Androcur-tablettia päivässä. Tabletit tulee ottaa aterian jälkeen nesteiden kera. Tämän lisäksi tulee raskauden ehkäisemiseksi ja kuukautiskierron säännöllistämiseksi käyttää kierron 1.–21. päivinä progestiinia ja estrogeenia sisältävää yhdistelmäehkäisyvalmistetta (Diane Nova).

Yhdistelmähoidon aikana tulee ehkäisytabletit ottaa säännöllisesti aina samaan aikaan vuorokaudesta.

21 päivän kuluttua pidetään ehkäisytablettien ottamisessa 7 päivän tauko, jonka aikana tulee kuukautisia muistuttava tyhjennysvuoto. Neljän viikon kuluttua hoidon aloittamisesta, samana viikonpäivänä kuin edelliselläkin kerralla, aloitetaan seuraava yhdistelmähoitojakso riippumatta siitä, onko vuoto jo loppunut vai jatkuuko se.

Oireiden lievittyä voidaan yhdistelmäehkäisytabletti (Diane Nova) -hoitoon yhdistetty, kierron 10 ensimmäisenä päivänä otettava Androcur-annos pienentää 1 tai ½ tablettiin. Joissakin tapauksissa jatkohoidoksi saattaa riittää pelkästään yhdistelmäehkäisytablettien (Diane Nova) käyttö.

Tyhjennysvuodon poisjääminen

Jos tyhjennysvuotoa ei tule yhdistelmäehkäisytablettien normaalin tablettitauon aikana, keskeytä hoito ja ota yhteys lääkäriin, sillä ennen hoidon jatkamista on varmistuttava siitä, ettet ole raskaana.

Potilaat, joilta on poistettu kohtu tai jotka ovat ohittaneet menopaussin

Potilaille, joilta on poistettu kohtu tai jotka ovat ohittaneet menopaussin, voidaan määrätä pelkästään Androcur-tabletteja. Oireiden vaikeusasteen mukaan annos on 1 tai ½ tablettia päivässä kierron 1.–21. päivinä, minkä jälkeen tablettien otossa pidetään 7 päivän tauko.

Jos Androcur-hoidon vaikutus tuntuu sinusta liian voimakkaalta tai liian heikolta, ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin.

Jos otat enemmän Androcur-tabletteja kuin sinun pitäisi

Tutkimusten perusteella Androcur-tablettien vaikuttavalla aineella eli syproteroniasetaatilla ei pitäisi olla myrkyllisiä vaikutuksia. Äkillisten haittavaikutusten riskiä ei myöskään ole, vaikka lääkettä otettaisiinkin vahingossa moninkertainen annos.

Jos unohdat ottaa Androcur-tabletteja

Miehet

Jätä unohtamasi Androcur-annos ottamatta (älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin) ja ota seuraava annos normaaliin aikaan.

Naiset

Androcur-tablettien unohtaminen saattaa vähentää hoitotehoa ja aiheuttaa välivuotoa. Jätä unohtamasi Androcur-annos ottamatta (älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin) ja ota seuraava annos normaaliin aikaan seuraavan yhdistelmäehkäisytabletin kanssa.

Yhdistelmähoidon aikana tulee ehkäisytabletit ottaa säännöllisesti aina samaan aikaan vuorokaudesta. Jos yhdistelmäehkäisytabletin ottaminen normaaliin aikaan unohtuu, ota unohtunut tabletti viimeistään 12 tunnin kuluessa. Jos unohtamisesta on kulunut yli 12 tuntia, valmisteen raskautta ehkäisevä teho voi olla heikentynyt sen kierron aikana.

Yhdistelmähoidon aikana on otettava huomioon myös yhdistelmäehkäisytablettien pakkausselosteessa olevat ohjeet (erityisesti tablettien ehkäisytehoon ja unohtamiseen liittyvät ohjeet). Jos tyhjennysvuotoa ei tule tällaisen kierron jälkeen, keskeytä hoito ja ota yhteys lääkäriin, sillä ennen hoidon jatkamista on varmistuttava siitä, ettet ole raskaana.

Jos lopetat Androcur-valmisteen käytön

Androcur-hoidon jälkeen sinulle saattaa ilmaantua uudelleen niitä oireita, joiden hoitoon valmistetta määrättiin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, Androcur-valmistekin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Vakavimmat Androcur-valmisteen käyttöön liittyvät haittavaikutukset ovat maksatoksisuus ja – kasvaimet sekä tromboemoliset tapahtumat (Ks. kohta "Hyvä tietää ennen Androcur-valmisteen käyttöä". Oheisessa taulukossa ovat muut syproteroniasetaatin käyttäjillä raportoidut haittavaikutukset, joiden yhteyttä Androcur-hoitoon ei ole sen paremmin vahvistettu kuin kumottukaan:

| Elinjärjestelmä | Erittäin yleinen (>1/10) | Yleinen (>1/100, <1/10) | Melko (harvinainen (>1/1 000, <1/100)) | Harvinainen (>1/10 000, <1/1 000) | Erittäin harvinainen (<1/10 000) |
|--|---|--|--|--|----------------------------------|
| Immuunijärjestelmän häiriöt | | | | yliherkkyysoireet | |
| Aineenvaihdunta- ja ravitsemushäiriöt | | painonnousu tai painonlasku | | | |
| Psyykkiset häiriöt | seksuaalivietin väheneminen (miehillä), erektiohäiriöt (miehillä) | masentuneisuus levottomuus (ohimenevä) | seksuaalivietin väheneminen (naisilla) | seksuaalivietin lisääntyminen (naisilla) | |
| Ihon ja ihonalaiskerrosten häiriöt | | | ihottuma | | |
| Tuki- ja liikuntaelimestön ja sidekudosten häiriöt | | | | | osteoporoosi (miehillä) |
| Sukuelinten ja rintojen häiriöt | ovulaation esto (naisilla) siittiöiden | rintojen arkuus (naisilla) gynekomastia | | | |

| | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|--|--|--|
| | tuotannon korjautuva esto (miehillä) | (miehillä) | | | |
| Yleisluontoiset ja annostuspaikan häiriöt | | uupumus kuumat aallot (miehillä) hikoilu (miehillä) | | | |

Androcur-hoidon aikana miehen seksuaalivietti ja potenssi heikkenevät ja kivesten toiminta estyy. Hoidon lopettamisen jälkeen nämä muutokset palautuvat.

Androcur-valmisteen antiandrogeenisen ja antigonadotrooppisen vaikutuksen seurauksena miesten siittiöiden tuotanto estyy usean viikon hoidon jälkeen. Siittiöiden tuotanto palautuu vähitellen muutamassa kuukaudessa, kun hoito lopetetaan.

Androcur saattaa joskus aiheuttaa miehille gynekomastiaa (rintojen suureneminen), johon liittyy joissakin tapauksissa voimakas nännien kosketusarkuus. Hoidon päätyttyä nämä muutokset yleensä häviävät.

Samoin kuin muiden antiandrogeenihoitojen, myös Androcur-hoidon aiheuttama pitkäaikainen androgeenivaje saattaa aiheuttaa miespotilaille osteoporoosia.

Multippeleita meningeomia on raportoitu pitkäaikaisen (useita vuosia jatkuneen) Androcur-hoidon yhteydessä, kun päiväannos on ollut vähintään 25 mg.

Naisilla hoito yhdistelmäehkäisyvalmisteen kanssa estää munasarjojen toimintaa, joten nainen ei voi tulla raskaaksi.

Yhdistelmähoitoon aikana on otettava huomioon myös yhdistelmäehkäisytablettien pakkausselosteessa mainitut tiedot valmisteen haittavaikutuksista.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai jos kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.

5. ANDROCUR-VALMISTEEN SÄILYTTÄMINEN

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim.) jälkeen.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä kysy apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Androcur-tabletit sisältävät

- Vaikuttava aine on syproteroniasetaatti. Yksi tabletti sisältää 50 mg syproteroniasetaattia.
- Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti (110,5 mg), maissitärkkelys, povidoni, vedetön kolloidinen piidioksidi ja magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus:

Androcur-tabletit ovat valkoisia, pyöreitä ja tasapintaisia tabletteja (halkaisija 9 mm). Tabletin toisella puolella on jakouurre ja toisella puolella tunnus "BV" kuusikulmiossa.

Pakkauskoko: 50 tablettia läpipainopakauksessa

Myyntiluvan haltija

Bayer Schering Pharma Oy
Pansiontie 47
20210 Turku

Markkinoija

Bayer Oy, Bayer Schering Pharma, PL 73, 02151 Espoo

Valmistaja

Delpharm Lille SAS, Lys-Lez-Lannoy, Ranska
tai
Schering GmbH and Co. Production KG, Weimar, Saksa

Tämä seloste on tarkistettu viimeksi 30.12.2009.